

RECOMENDAÇÃO DE USO DA VACINA ADSORVIDA HEPATITE B POR FAIXA ETÁRIA

(se mantidos em condições assépticas e armazenados em temperaturas entre +2°C e +8°C)

LABORATÓRIO	APRESENTAÇÃO FRASCO	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	VALIDADE APÓS ABERTO	IDADE	VOLUME DOSE	LOCAL DE APLICAÇÃO	CALIBRE AGULHA
INSTITUTO BUTANTAN	5 ML	IM	15 DIAS	0 A 19 ANOS	0,5 ml	< 2 anos: vasto lateral da coxa > 2 anos: vasto lateral da coxa ou deltóide	20 x 5,5
				20 ANOS E MAIS	1 ml	> 20 anos: deltóide	25 x 6 ou 25 x 7
INSTITUTO BUTANTAN/ LG CHEM	10 ML	IM	10 DIAS	0 A 15 ANOS	0,5 ml	< 2 anos: vasto lateral da coxa > 2 anos: vasto lateral da coxa ou deltóide	20 x 5,5
				16 ANOS E MAIS	1 ml	> 16 anos: deltóide	25 x 6 ou 25 x 7
SERUM INSTITUTO INDIA	10 ML	IM	28 DIAS	0 A 19 ANOS	0,5 ml	< 2 anos: vasto lateral da coxa > 2 anos: vasto lateral da coxa ou deltóide	20 x 5,5
				20 ANOS E MAIS	1 ml	> 20 anos: deltóide	25 x 6 ou 25 x 7
LG CHEM	10 ML	IM	28 DIAS	0 A 15 ANOS	0,5 ml	< 2 anos: vasto lateral da coxa > 2 anos: vasto lateral da coxa ou deltóide	20 x 5,5
				16 ANOS E MAIS	1 ml	> 16 anos: deltóide	25 x 6 ou 25 x 7

Atenção com os casos especiais tais como: Renais crônicos devem receber 4 doses com o dobro da dose para a idade, respeitando o esquema de 0, 1, 2 e 6 meses

Revisado em: 29/09/2022 – Central de Imunização – Contagem-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida General David Sarnoff, 3113 | Cidade Industrial | Contagem - MG | 32210-110

CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO

(31) 3364-4702/3393-6780 | vacina@contagem.mg.gov.br