



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE ARBOVIROSES EM CRIANÇAS MENORES 2 DE ANOS

UBS REALIZA ATENDIMENTO DE CRIANÇA < DE 2 ANOS

CASO SUSPEITO DE ARBOVIROSE?

Realizar avaliação clínica e atendimento considerando a classificação inicial como grupo B

CRIANÇA CLASSIFICADA COMO GRUPO B:

- INICIAR HIDRATAÇÃO ORAL
- PREENCHER O CARTÃO DE DENGUE
- NOTIFICAR EM DUAS VIAS
- ENTRAR EM CONTATO COM UNIDADE DE REFERÊNCIA EM **PEDIATRIA** PARA ENCAMINHAMENTO DA CRIANÇA
- ✓ **CENTRO MATERNO INFANTIL (CMI):** DISTRITOS ELDORADO, RIACHO, INDUSTRIAL, SEDE E PETROLÂNDIA
- ✓ **UPA RESSACA:** DISTRITOS RESSACA E NACIONAL
- ✓ **UPA VAGEM DAS FLORES:** DISTRITO VARGEM DAS FLORES

CRIANÇA CLASSIFICADA COMO GRUPO C OU D:

- INICIAR HIDRATAÇÃO VENOSA;
- ENTRAR EM CONTATO COM O SAMU PARA TRANSFERÊNCIA DA CRIANÇA;
- COMUNICAR IMEDIATAMENTE A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA;
- MONITORAR CASO ATÉ CHEGADA DO SAMU;
- PREENCHER O CARTÃO DE DENGUE;
- NOTIFICAR EM DUAS VIAS (**NOTA TÉCNICA CONJUNTA SVS E SAS Nº 001**);

UNIDADES DE URGÊNCIA (UPA/CMI) REALIZA O ATENDIMENTO

SIM

Criança necessita de observação/internação?

NÃO

CRIANÇA PERMANECE EM OBSERVAÇÃO/INTERNAÇÃO

ALTA

CONTRA-REFERENCIAMENTO PARA SEGUIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE REFERÊNCIA

TELEFONE DE CONTATOS PARA REFERENCIAMENTO:

- PA PEDIÁTRICO (CMI): 3356-2100/3363-5300
- UPA RESSACA: 9260-3658- Líder
- UPA VARGEM DAS FLORES: 998384165- Líder
- EPIDEMIOLOGIA CENTRAL (DE SEGUNDA A SEXTA DE 8:00 AS 17:00): 34726344 /6345
- CIEVS (FINAL DE SEMANA, FERIADOS E DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA APÓS AS 17:00): 992570312



Valores de Hidratação Oral

GRUPO A OU B

*A hidratação oral dos pacientes com suspeita de dengue deve ser iniciada ainda na sala de espera enquanto aguardam consulta médica.

Volume diário da hidratação oral:

- Orientar paciente e o cuidador para hidratação por via oral. Oferecer 1/3 na forma SRO e o restante através da oferta de água, sucos e chás. Considerar o volume de líquidos a ser ingerido conforme recomendação a seguir (baseado na regra de Holliday Segar acrescido de reposição de possíveis perdas de 3%):
- ✓ Crianças até 10kg: 100 ml/kg/dia]
- ✓ Crianças de 10 a 20kg: 1000 ml + 50 ml/kg/dia para cada kg acima de 10 kg
- ✓ Crianças de 20kg a 30kg: 1500 ml + 20 ml/kg/dia para cada kg acima de 20 kg
- ✓ Crianças acima de 30kg: 40 a 60 ml/kg/dia ou 1700 a 2000 ml/m² de superfície corporal

Recomendações:

- Quando não for possível aferir o peso em crianças, utilizar a fórmula aproximada para cálculo do peso
- ✓ Lactentes de 3 a 12 meses: $P = \text{idade em meses} \times 0,5 + 4,5$
- ✓ Crianças de 1 a 8 anos: $P = \text{idade em anos} \times 2 + 8,5$
- Nas primeiras 4 a 6 horas do atendimento considerar a oferta de 1/3 deste volume. Especificar em receita médica ou no cartão da dengue/arboviroses o volume a ser ingerido.
- A alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação e sim administrada de acordo com a aceitação do paciente.
- O aleitamento materno deve ser mantido e estimulado

Valores de Hidratação venosa com Soro Fisiológico 0,9%

GRUPO C

Fase de expansão: de 10 ml/Kg/hora na 1ª hora, com reavaliação clínica após 1 hora (sinais vitais, PA, avaliar diurese e hematócrito, se disponível). Se não houver melhora dos sinais hemodinâmicos na reavaliação, repetir a fase de expansão até três vezes.

Se houver melhora clínica e laboratorial após a(s) fase(s) de expansão, iniciar a fase de manutenção:

- **Primeira fase**: 25 ml/kg em 6 horas. Se houver melhora iniciar segunda fase.
- **Segunda fase**: 25 ml/kg em 8 horas.

GRUPO D

Iniciar imediatamente fase de expansão rápida parenteral, com solução salina isotônica: 20ml/Kg em até 20 minutos

Reavaliação clínica a cada 15-30 minutos e de hematócrito em 2 horas, se teste rápido disponível.

Se não houver melhora clínica repetir por até três vezes, de acordo com avaliação clínica;