



## FLUXO DE ATENDIMENTO A GESTANTE COM EXANTEMA

### CASO SUSPEITO

Gestantes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso, acompanhado de pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: subfebril ou febre baixa  $\leq 38,5^{\circ}\text{C}$ ; hiperemia conjuntival sem secreção e prurido; poliartralgia; edema periarticular.

#### Informar imediatamente para

- EPIDEMIOLOGIA CENTRAL (DE SEGUNDA A SEXTA DE 8:00 AS 17:00): 34726344 /6345
- CIEVS (FINAL DE SEMANA, FERIADOS E DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA APÓS AS 17:00): 992570312

REALIZAR NOTIFICAÇÃO EM 2 VIAS IMEDIATAMENTE (NOTA TÉCNICA CONJUNTA SVS E SAS) – (1ª via serviço epidemiologia e 2ª via FUNED para encaminhamento amostras) na ficha de Notificação/Conclusão, todos os casos de ZIKA

ENCAMINHAR A GESTANTE PARA COLETA DE AMOSTRA (SANGUE), COM 1ª VIA DA NOTIFICAÇÃO:

- Se atendimento até o 5º dia após o início dos sinais/sintomas, COLETAR SANGUE PARA EXAME DE PCR.
- Se PCR negativo ou 1º atendimento a partir do 6º dia. Coletar sorologia, conforme hipótese diagnóstica

SIM

**Diagnóstico confirmado laboratorialmente?**

NÃO

A GESTANTE DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O **PNAR** E MANTER VINCULO COM A UNIDADE DE SAÚDE DE REFERENCIA

#### DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Solicitar sorologia Chikungunya e Dengue

#### RECOMENDAÇÕES PARA O PNAR

Realizar exames 2 ultrassonográficos:

- entre 20 e 24 semanas
- entre 32 a 35 semanas