



## FLUXOGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM SUSPEITA DE ARBOVIROSE SEM SINAIS DE GRAVIDADE OU ALARME OU FATORES DE RISCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

### Grupo A


Presença de febre, com 2 a 7 dias de duração, e duas ou mais das seguintes manifestações: náusea, vômitos; exantema; mialgias, artralgia; cefaleia, dor retro-orbital;

- Ausência de sinais de gravidade ou choque
- Ausência de sinais de alarme
- Ausência de fatores de risco (idade, comorbidades e social) e
- Prova do laço negativa

- REALIZAR notificação (conforme NOTA TÉCNICA CONJUNTA SVS E SAS);
- Se atendimento até o 5º dia após o início dos sinais/sintomas, coletar sangue para exame de PCR, em qualquer posto de coleta com a notificação em mãos entre 9:00 e 13:00 h.
- Se atendimento após 6º dia de sintomas orientar coleta de sorologia (ELISA IGM), conforme hipótese diagnóstica, em qualquer posto de coleta com a notificação em mãos entre 9:00 e 13:00 h;

### Tratamento no Domicílio

- Acompanhamento domiciliar
- Medicamentos para alívio da sintomatologia: analgésico, antipirético (dipirona ou paracetamol).
- Hidratação<sup>1</sup>: 60ml/kg/dia- 1/3 sais de reidratação oral nas primeiras 4 horas e o restante com outros líquidos como chás, sopa, sucos até 24 horas após melhora da febre
- Orientar sobre sinais de alarme e gravidade.
- Orientar retorno até 24 horas após término da febre ou no quinto dia se mantiver febre



**Retornar em até 24 horas do término da febre e no 5º dia se mantiver febre**

**Seguir protocolo Grupo C ou D**



## Valores de Hidratação Oral:

### GRUPO A E B

\*A hidratação oral dos pacientes com suspeita de dengue deve ser iniciada ainda na sala de espera enquanto aguardam consulta médica.

Volume diário da hidratação oral:

- Adultos: 60 ml/kg/dia, sendo 1/3 com soro de reidratação oral (SRO) e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros (água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, etc.)
- Crianças (< 13 anos de idade): orientar paciente e o cuidador para hidratação por via oral. Oferecer 1/3 na forma SRO e o restante através da oferta de água, sucos e chás. Considerar o volume de líquidos a ser ingerido conforme recomendação a seguir (baseado na regra de *Holliday Segar* acrescido de reposição de possíveis perdas de 3%):
  - ✓ Crianças até 10 kg: 130 ml/kg/dia
  - ✓ Crianças de 10 a 20 kg: 100 ml/kg/dia
  - ✓ Crianças acima de 20 kg: 80 ml/kg/dia

Recomendações:

- Quando não for possível aferir o peso em crianças, utilizar a fórmula aproximada para cálculo do peso
  - ✓ Lactentes de 3 a 12 meses:  $P = \text{idade em meses} \times 0,5 + 4,5$
  - ✓ Crianças de 1 a 8 anos:  $P = \text{idade em anos} \times 2 + 8,5$
- Nas primeiras 4 a 6 horas do atendimento considerar a oferta de 1/3 deste volume. Especificar em receita médica ou no cartão da dengue o volume a ser ingerido.
- A alimentação não deve ser interrompida durante a hidratação e sim administrada de acordo com a aceitação do paciente.
- O aleitamento materno deve ser mantido e estimulado